taille. ~~[illegible]~~

+ le fils de charle bertrand de vienne la ville

n.° 90.

Dans le Courant du Mois de May dernier, Je fus appellé dans un Village prés S.te Manehould pour voir un Enfant de l'age de neuf a dix ans, qui depuis cinq ans étoit incommodé de douleurs presque continuelles dans la région de la vessie, alors Insupportables; accompagnée de difficulté d'uriner et de bâtir, ne pouvant plus se tenir debout, les parents avoient mis en usage differents remedes qui leurs avoient été Conseillés, mais qui n'eurent aucun Succés; ayant Examiné cet Enfant Je ne doutay pas que tous les accidents qu'il éprouvoient, ne soient occasionné par la présence d'une pierre dans la vessie et pour mes assurer Je le Sonday dans le moment, et je luy trouvay une effectivement mais

Pierre Engagée dans le Col, alias taille de Celse

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 37 n° 20

Si grosse et occupant si Exactement
le Col dela vessie que Je ne pus
introduire lalgalie au dela de Cette
pierre y la faisa varier; J'annonçai
aux parents le besoin pressant de
l'opération et le danger dela differer.
Je la fit dans l'instant; J'introduisit le
doigt indice dela main gauche dans
lanus pour assujettir la pierre, Je
fis une Incision au perine à Coté du
Raphe et parvenus au tissu Cellulaire
Je trouvai un dépot assés considérable
duquel il Sortit beaucoup de pus mais
de bonne qualité, la pierre avoit percé la
vessie et etoit entier passee dans le tissu
Cellulaire qui étoit en partie détruit, le
Surplus étant resté engagé entre les -
os pubis, J'eus assés de peine à le retirer

avec une tenette, parceque cette
Extremité étoit plus grosse que celle qui
étoit sortie la premiere, la pierre pesoit
prés de deux onces; aussitot l'opération
je saignaj l'enfant, je fit faire usage
sur le ventre de fomentations trés emollientes,
et je fit pour tous pansemens á la plaie
trois fois le jour des injections détersibs,
avec une ligature aux jambes genoules
maintenues raprochees; le lendemain
la fiévre commenca á diminuer et continua
de meme les jours suivants, la plaie
se détergea en fort peu de tems, ensorte
que trois semaines aprés l'opération,
les urines reprirent leurs cours ordinaires
et que cet enfant fut radicallement
guerj au bout d'un mois.
nulle marque Exterieure n'annoncoit

de dépot, le périne étoit dans son état
naturel, cependant je ne doute pas que si
la pierre n'eut été arretée par l'une de ces
extrémités entre les os pubis, qu'après
avoir détruit le tissu cellulaire
par l'irritation qu'elle y a causé, qui
a amené le dépot que j'ai trouvé elle
n'eut égallement causé la destruction de
la peau et ne se soit fait elle même
un jour avant que ces gens eussent
songé à demander mon secours;
les accidents étoient si violents surtout
la rétention d'urines; que j'ai cru devoir
opérer avant d'avoir administré aucun
des remedes généraux. persuadé qu'il
n'y avoit que l'extraction de la pierre qui
puisse faire cesser ce dernier accident.

Chemery hapé ancien
chgn des camps et armées du
Roy et M.tre en chirurgie

à Vienne le Chateau ce 3. 7bre 1770. f.